

با اسمه تعالی

وزارت آموزش و پرورش

باشگاه دانش پژوهان جوان

مسابقات علمی برای جوانان، زنده کردن روح جست و جو و کشف واقعیت‌هاست. «امام خمینی (ره)»



دفترچه سوالات باشگاه طلایی ها

چهاردهمین المپیاد زیست‌شناسی کشور

مرحله اول

۶ بهمن ماه ۱۳۸۹ (۰۰:۰۰ تا ۱۲:۰۰)

کد دفترچه سوالات : ۱

مدت آزمون : ۱۸۰ دقیقه

تذکرات :

ضمن آرزوی موفقیت برای شما داوطلب گرامی، خواهشمند است به موارد زیر دقیقاً توجه کنید.

(۱) کد دفترچه سوالات شما ۱ است. این کد را در محل مربوط روی پاسخ‌نامه بنویسید. در غیر این صورت پاسخ‌نامه شما تصحیح نخواهد شد. توجه داشته باشید کد دفترچه سوالات شما که در زیر هر یک از صفحه‌های این دفترچه نوشته شده است، با کد اصلی که در همین صفحه است یکی باشد.

(۲) تعداد سوال‌های این آزمون ۴۸ سوال (۴۲ سوال چهار یا پنج گزینه‌ای و ۶ مسئله کوتاه) و وقت آزمون ۱۸۰ دقیقه است. در هر سوال چند گزینه‌ای، از میان گزینه‌های داده شده، دقیقاً یک گزینه پاسخ درست آن سوال است.

(۳) به جداول ابتدای دفترچه (صفحة بعد) و ابتدای هر بخش از پرسش‌ها بسیار دقت کنید.

(۴) مشخصات خواسته شده را «به طور کامل» روی برگه‌ی پاسخ‌نامه بنویسید. در صورت کامل نبودن اطلاعات خواسته شده، یا غلط بودن آن‌ها پاسخ‌نامه‌ی شما تصحیح نخواهد شد.

(۵) همراه داشتن تلفن همراه مجاز نیست. اگر همراه دارید در اسرع وقت مسئول جلسه را مطلع کنید تا آن را تحويل بگیرد. در غیر این صورت حتی اگر از آن استفاده نکنید تقلب محسوب خواهد شد. استفاده از ماتشین حساب مجاز است.

(۶) برگه‌ی پاسخ‌نامه را دستگاه تصحیح می‌کند، پس آن را تا نکنید و تمیز نگه دارید.

(۷) نتیجه‌ی این آزمون اواخر اسفند ماه اعلام خواهد شد.

(۸) پس از پایان آزمون می‌توانید دفترچه سوالات را همراه خود ببرید.

آدرس سایت اینترنتی : www.ysc.ac.ir

کلیه حقوق این سوالات برای باشگاه دانش پژوهان جوان محفوظ است.

جدول ثابت‌ها

داوطلب گرامی، در صورتی که در پاسخ به پرسش‌های این آزمون به مقادیر برخی از موارد نیاز داشتید، ملزم به استفاده از اعداد و روابط جدول زیر خواهید بود. در غیر این صورت پاسخ شما نادرست تلقی خواهد شد.

عنوان	مقدار / تعریف	عنوان	مقدار / تعریف
دماهی صفر مطلق	-۲۷۳- درجه سانتیگراد	π	۳/۱۴
۱ کالری	۴/۱۸ ژول	عدد آووگادرو	$۶/۰۲۲ \times 10^{۲۳}$
سرعت نور	۳×10^۸ متر بر ثانیه	ثابت بولتزمن	$۱/۳۸ \times 10^{-۱۵} \text{ erg.deg}^{-1}$

باشگاه طلایی‌ها

جدول گذنیکی آمینو اسیدها

	U	C	A	G	
U	UUU Phe	UCU Ser	UAU Tyr	UGU Cys	U
	UUC Phe	UCC Ser	UAC Tyr	UGC Cys	C
	UUA Leu	UCA Ser	UAA Stop	UGA Stop	A
	UUG Leu	UCG Ser	UAG Stop	UGG Trp	G
C	CUU Leu	CCU Pro	CAU His	CGU Arg	U
	CUC Leu	CCC Pro	CAC His	CGC Arg	C
	CUA Leu	CCA Pro	CAA Gln	CGA Arg	A
	CUG Leu	CCG Pro	CAG Gln	CGG Arg	G
A	AUU Ile	ACU Thr	AAU Asn	AGU Ser	U
	AUC Ile	ACC Thr	AAC Asn	AGC Ser	C
	AUA Ile	ACA Thr	AAA Lys	AGA Arg	A
	AUG Met*	ACG Thr	AAG Lys	AGG Arg	G
G	GUU Val	GCU Ala	GAU Asp	GGU Gly	U
	GUC Val	GCC Ala	GAC Asp	GGC Gly	C
	GUA Val	GCA Ala	GAA Glu	GGA Gly	A
	GUG Val	GCG Ala	GAG Glu	GGG Gly	G


کدون آغاز ترجمه است. AUG *

پرسش‌های چندگزینه‌ای

در هر پرسش این بخش، بهترین و کامل‌ترین گزینه را به عنوان پاسخ آن انتخاب کنید و در پاسخنامه خود علامت بزنید.

نمره هر پرسش در مقابل شماره آن نوشته شده است.

پاسخ نادرست به هر پرسش به اندازه یک سوم نمره سوال، نمره منفی خواهد داشت.



۱. (۳ نمره) کدام گزاره‌ها درباره مولکول رو به رو درست نیست؟

I. این مولکول در حالت رسم شده، ۱۷ اتم هیدروژن دارد.

II. در محیط‌های اکسیداتیو به راحتی می‌تواند با یک مولکول مشابه پیوند کووالانسی برقرار کند.

III. دارای یک پیوند پیتیدی است.

IV. گروه کربوکسیل در ساختار آن وجود ندارد.

V. یک آمینواسید با زنجیره جانبی اسیدی در ساختار آن شرکت ندارد.

باشگاه طلایی‌ها

ه) IV و III

د) II و IV

ج) II و V

ب) I و III و V

الف) I و IV

* پرسش‌های ۲ و ۳: پلی‌پیتید (polypeptide) محسول الـ سالم یک زن است. الـ دیگر این زن (ناسالم) تحت تأثیر یک جهش نقطه‌ای (تغییر در یک نوکلئوتید) در الـ سالم ایجاد شده است. توالی پروتئین حاصل از این الـ در یکی از آمینواسیدها با پلی‌پیتید الـ سالم تفاوت دارد. از آنجا که

زنجیره جانبی آمینواسید جدید باردار است، کافورهاسیون طبیعی پروتئین را به هم می‌زند و آن را غیر فعال می‌کند. cDNA این دو پلی‌پیتید را استخراج کردیم (cDNA) یک زن، DNA ای است که توالی آن مشابه با آن زن، بدون اینtron‌ها است) و عمر کدام را توسط یک آنزیم محدود کننده برش دادیم. سپس محصولات را با روش الکتروفورز بررسی کردیم. شکل مقابل نتیجه این الکتروفورز را نشان می‌دهد. (باندهای نمایش داده شده در ستون مارکر، مربوط به ۹۰، ۶۰ و ۳۰ جفت‌بازی است)

۲. (۳ نمره) کدام گزینه زیر می‌تواند به ترتیب بیانگر آمینواسید پروتئین سالم و آمینواسید تغییر یافته متناظرش در پروتئین ناسالم باشد؟

(الف) سرین و آلانین (ب) کلوتامات و لوسین (ج) ایزولوسین و ایزولوسین (د) گلیسین و ایزولوسین (ه) لوسین و آرژینین

۳. (۳ نمره) اگر توالی شناسایی آنزیم محدود کننده مورد استفاده ما ۵'-AGCGCT-۳' باشد، جانشینی آن با کدام آنزیم محدود کننده که در جدول زیر آمده است، نتیجه مشابهی در بر خواهد داشت؟

نام آنزیم	توالی شناسایی و مکان برش آنزیم
A	5'-ATATAT-۳'
B	5'-AACGTT-۳'
C	5'-AGATCT-۳'
D	5'-GAATTC-۳'

ه) C و D


د) B و D

ج) A و B

ب) C

الف) A

۴. (۳ نمره) بسیاری از مطالعات روی انتقال درون‌سلولی اندامک‌ها در رشته‌های عصبی (اکسون‌ها) انجام می‌شود؛ زیرا در این زایده‌های سلولی، رشته‌های اسکلت سلولی به صورت دستگاه موازی سازمان‌دهی شده‌اند و اندامک‌ها روی آن‌ها روبه‌جلو (به سمت پایانه عصبی) یا روبه‌عقب (به سوی جسم سلولی) حمل می‌شوند. بنابراین بررسی کمی انتقال درون‌سلولی به آسانی میسر می‌شود. پژوهشگری انتقال وزیکول‌های حامل انتقال‌دهنده‌های عصبی را در اکسون‌های سلول‌های عصبی محیط کشت با میکروسکوپ مطالعه و از اکسون‌ها در فواصل زمانی منظم عکس برداری کرد. طرحی از اولین تصویر را در شکل زیر مشاهده می‌کنید.



او سپس با رایانه، تصویر فوق را در راستای عمودی فشرده کرد تا تصویر زیر به دست آید:

او همین کار را برای همه تصاویر تکرار کرد و تصاویر فشرده حاصل را به ترتیب زیر هم قرار داد تا تصویر زیر به دست آید. این تصویر حرکت‌نگار (Kymograph) نام دارد. بدیهی است که در این نمودار، محور افقی مکان و محور عمودی زمان را نشان می‌دهد.




کدام مجموعه از گزاره‌ها درست است؟

- I. بیشتر وزیکول‌ها طی حرکت، جهت حرکت خود را تغییر می‌دهند.
- II. حرکت روبه‌جلوی وزیکول‌ها سریع‌تر از حرکت روبه‌عقب است.
- III. سرعت حرکت روبه‌جلو با حرکت روبه‌عقب برابر است.
- IV. وزیکول‌هایی که روبه‌جلو حرکت می‌کنند، توقف‌های طولانی‌تری دارند.
- V. اگر سرعت وزیکول‌هایی که روبه‌جلو حرکت می‌کنند افزایش یابد، شار روبه‌جلوی وزیکول‌ها (یعنی تعداد وزیکول‌هایی که از هر مقطع از اکسون به طرف جلو عبور می‌کنند) به طور متوسط افزایش می‌یابد.

- الف) II و I
- ب) V و III و I
- ج) V و IV و II
- د) IV
- ه) V

۵. (۳ نمره) سلول‌های بنیادین در بدن چانداران پرسلوی، می‌توانند با تقسیم، سلول‌های مشابه خود و یا سلول‌های تمایزیافته تولید کنند. هر سلول بنیادین می‌تواند به دو صورت تقسیم شود: در تقسیم متقارن، یک سلول بنیادین به دو سلول یکسان (هردو تمایزیافته یا هردو تمایزیافته) تقسیم می‌شود. در تقسیم نامتقارن، از یک سلول بنیادین، یک سلول تمایزیافته (تمایزیافته) و یک سلول تمایزیافته تولید می‌شود (شکل). فرض کنید در جمعیتی از سلول‌های بنیادین اولیه، کسر a از سلول‌ها با استراتژی اول، کسر b با استراتژی دوم و بقیه $(1-a-b)$ با استراتژی سوم تقسیم می‌شوند. چه کسری از سلول‌های نسل بعدی، تمایزیافته خواهد بود؟



$$(h) b + (a \div 2) \quad (d) 1 - (a+b) \div 2 \quad (j) (1-a-b) \div 2 \quad (b) b - (a \div 2) \quad (a) a + (b \div 2)$$

باشگاه طلایی‌ها

۶ (۲ نمره) یک سلول گیاهی به شکل مکعب را در نظر بگیرید که در یک بعد رشد می‌کند و به دو سلول دختری تقسیم می‌شود. اگر حجم هر یک از سلول‌های حاصل، حدود ۷۵٪ حجم اولیه سلول مادری باشد، سلول مادری طی رشد و تقسیم معادل چند برابر سطح غشای پلاسمایی خود، غشای پلاسمایی جدید سنتز کرده است؟ (راهنمایی: سلول‌های دختری مکعب نیستند).

$$(h) 75\% \quad (d) 66\% \quad (j) 50\% \quad (b) 33\% \quad (a) 25\%$$

۷. (۲ نمره) واکنش‌های خود به خودی دارای تغییرات انرژی آزاد (ΔG) منفی هستند. اگر واکنشی دارای $\Delta G = +3/5 \text{ KJ/mole}$ باشد، برای انجام در شرایط داخل سلولی باید با چه واکنش دیگری چفت شود؟



۸. (۴ نمره) پس از تقسیم سلولی و تشکیل غشای سلولی، پروتئین‌های جدید ساخته شده به داخل غشا وارد می‌شوند. میزان نفوذ پروتئین‌های مختلف به غشا به شکل آن‌ها و همچنین میزان ویسکوزیتۀ محیط وابسته است. مقدار انتشار هر پروتئین به ضریب انتشار (D) آن پروتئین وابسته است و از رابطه زیر محاسبه می‌شود:

$$D = \frac{k T}{6 \pi \eta r}$$


در این رابطه η میزان ویسکوزیتۀ محیط، r شعاع مولکول، k ثابت بولتزمن و T مقدار دمای مطلق است. با توجه به این رابطه میزان ضریب انتشار (D) یک پروتئین کروی ۱۰۰ کیلوالتویی در غشایی با ویسکوزیتۀ موثر معادل $1 \text{ poise} = 1 \text{ erg} \times \text{s/cm}^3$ چقدر است؟ (فرض کنید که پروتئین، یک کره بدون آب و با دانسیتۀ $1/35 \text{ g/cm}^3$ باشد.)

$2/1 \times 10^{-7} \text{ cm}^2/\text{s}$	(b)	$7/3 \times 10^{-8} \text{ cm}^2/\text{s}$	(f)
$7/3 \times 10^{-12} \text{ cm}^2/\text{s}$	(d)	$3 \times 10^{-11} \text{ cm}^2/\text{s}$	(g)
		$9 \times 10^{-10} \text{ cm}^2/\text{s}$	(h)

۹. (۲ points) Which statements describe the following molecule?

- I. It is a water insoluble carbohydrate.
- II. It is a polymer of glucose.
- III. It can be digested by human saliva.
- IV. It is found abundantly in plant cell cytoplasm.
- V. It breaks into sucrose.

- (الف) I, II
 (ب) III, IV
 (ج) I, II, IV
 (د) III, IV, V
 (ه) II, III, IV



۱۰. (۲ نمره) دانش آموزی تصویری را روی لام قرار داد و آن را با عذری شیئی ۴۵ یک میکروسکوپ دوچشمی که هر عذری چشمی آن تصویر را ۱۰ برابر می کند مشاهده کرد. میکروسکوپ این تصویر را چند برابر نشان می دهد؟

ه) ۸۰۰ برابر

د) ۴۰۰ برابر

ج) ۱۰ برابر

ب) ۴ برابر

باشگاه طلاب‌ها

۱۱. (۲ نمره) برای این که یک سلول زیگوت بتواند جنسی سالم و بی نقص بسازد، لازم است محتوای ژنتیکی آن کامل و سالم باشد. لذا نقص در ماده ژنتیک زیگوت ممکن است باعث نقصی در تکوین جین شود. طیف این ضایعات بسیار گسترده بوده و می تواند از یک نقص بسیار کوچک و خفیف تا نواقص بسیار بزرگ مغایر با حیات، باشند. تعیین کنید کدام یک از عبارات زیر درست است؟

- I. غالباً تریزوومی هر کروموزوم، نقصی خفیفتر از مونوزومی آن ایجاد می کند.
 II. نواقص کروموزومی اثرات خفیفتری در مقایسه با چهشنهای نقطه‌ای دارد.
 III. نواقص بسیار بزرگ (مثل مونوزومی ۱) هیچ‌گاه در کاریوتیپ جنین متولد شده (چه زنده و چه مرد) دیده نمی شوند.
 IV. نواقص بسیار شدید (مثل مونوزومی ۱) بار اجتماعی و اقتصادی کمتری نسبت به نواقص متوسط (مثل تریزوومی ۱۸) دارند.
 V. نواقص حذف کروموزوم‌های جنسی اثرات خفیفتری نسبت به حذف سایر کروموزوم‌ها دارند.

ه) I و II و IV

د) I و III و IV

ج) II و III و V

الف) I و II و V

۱۲. (۴ نمره) تصور کنید برای دو زن فرضی A و B در کروموزوم شماره ۲ در مگس سرکه به ترتیب دو ال a^{sl} و b^{sl} شناسایی شده‌اند. وجود همزمان این دو ال در یک جانور کشنده است (یا عذری مرگ آن در مرحله لاروی می‌شود). به این پدیده کشنندگی ستزی گفته می‌شود. پژوهشگری با مهندسی ژنتیک، تسلیمی از هریک از این ال‌ها را وارد کروموزوم شماره ۳ مگس کرد. او اکنون مگس‌هایی با ژنوتیپ‌های زیر در اختیار دارد. از آمیزش این مگس‌ها، چه درصدی از مگس‌های نسل بعد دارای دو نسخه از asl خواهند بود؟ علامت + نشان‌دهنده کروموزوم طبیعی (نوع وحشتی) است.

کروموزوم ۲	کروموزوم ۳	کروموزوم ۲	کروموزوم ۳
b^{sl}	+	a^{sl}	a^{sl}
+	+	+	+
(ه) ۴۴٪	(د) ۴۰٪	(ج) ۳۳٪	(ب) ۲۵٪

الف) ۲۰٪

د) ۲۵٪

ج) ۳۳٪

ب) ۴۰٪

۱۳. (۳ نمره) لوکوس‌های مرتبط با گروه خونی در جمعیتی در تعادل هارددی - واینبرگ قرار دارند. در این جمعیت فراوانی ال‌های I^A , I^B و I^i به ترتیب $0/3$, $0/5$ و $0/2$ است. می‌دانیم ۱٪ افراد این جمعیت می‌توانند به فردی با گروه خونی B^- خون اهدا کنند. چند درصد افراد این جمعیت

- دارای گروه خونی A^+ هستند؟

ه) ۵۵٪

د) ۵۲٪

ج) ۴۴٪

ب) ۴۱٪

الف) ۲۴٪

۱۴. (۲ نمره) خوک خرطومدار در حوزه آسیای جنوب شرقی و امریکای مرکزی مشاهده می‌شود. مناسب‌ترین ترکیب بیان کننده علت حضور اعضاً این خانواده در دو سوی جهان را انتخاب کنید.

- | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------|----------------|
| I. از بین رفتن جمعیت‌های بینایی‌بینایی | II. انتقال توسط انسان | III. تکامل مستقل در دو نقطه از جهان (همگرایی) | IV. استقاق قاره‌ها | الف) I و II |
| V. صرفه‌جویی در دفع آب | VI. جلد اندازی | VII. توانایی بالای تکثیر | ج) III و IV | ب) III و IV |
| (د) I و III | (ه) III و IV | (ب) IV و V | (ج) IV و V | (الف) II و III |

۱۵. (۲ نمره) علت بقای حشرات نسبت به اجداد دریازی آن‌ها کدام است؟

- | | | | | | | | |
|---------------|-------------------|--------------------------|----------------|------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|
| I. جلد اندازی | II. دفع اوریکاسید | III. توانایی بالای تکثیر | IV. جلد اندازی | V. دفع اوریکاسید | VI. صرفه‌جویی در دفع آب | VII. توانایی بالای تکثیر | (الف) II و III |
| (ه) III و IV | (د) III و IV | (ب) IV و V | (ج) IV و V | (د) III و IV | (ه) III و IV | (ب) IV و V | (الف) II و III |

۱۶. (۲ points) The structure of heart and circulatory system varies among different vertebrates. Three sample animals have the following characteristics:

I. The oxygenated and deoxygenated blood is mixed in the heart of this animal.

II. It has a four chambered heart.

III. Only deoxygenated blood is pumped through the heart of this animal.

Choose the correct choice which matches the above three animals respectively -left to right.

(الف) frog, crocodile, fish
(ج) lizard, fish, snake

(ب) eagle, koala, fish
(د) platypus, eagle, frog

۱۷. (۲ نمره) می‌دانیم که وقتی یک آنتی‌زن (متلا بر سطح یک باکتری) وارد بدن می‌شود با گیرنده اختصاصی خود بر سطح لنفوسيت‌های B و T جفت شده و بدین ترتیب پاسخ ایمنی اختصاصی علیه آن آغاز می‌شود. سیستم ایمنی ما از کجا می‌داند که چه آنتی‌زن‌هایی قرار است وارد بدن ما شوند که پیش‌بینی برای آن‌ها گیرنده ساخته است؟ درست‌ترین عبارت را راجع به عملکرد سیستم ایمنی انتخاب کنید.

الف) تکامل سیستم ایمنی، نقشی در ایجاد تنوع پاسخ‌های ایمنی ندارد.

ب) انعطاف‌پذیری گیرنده‌های بدن، تنوع پاسخ سیستم ایمنی را منجر می‌شود.


ج) بدن به صورت تصادفی و قبل از برخورد با آنتی‌زن تمام انواع گیرنده‌هایی را که می‌تواند می‌سازد.

د) سلول ایمنی آنتی‌زن را وارد خود کرده و دور آن گیرنده‌ای که با آن در برخوردهای بعدی جفت است را می‌سازد.

۱۸. (۲ نمره) در هر ضربان قلب، به کدامیک از اعضاً زیر مقدار خون بیشتری می‌رسد؟

- | | | | | |
|---------|------------|------------------------------|----------------|---------------|
| (ه) کبد | (د) ریه‌ها | (ب) مجموعه ماهیچه‌های اسکلتی | (ج) مغز و نخاع | (الف) کلیه‌ها |
|---------|------------|------------------------------|----------------|---------------|

* پرسش‌های ۱۹ و ۲۰: با توجه به نمودار روبرو به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:




۱۹. (۳ نمره) اگر تأثیر هر قسمت از نفرون بر اسماک‌ریته (تفیرات اسماک‌ریته) مایع درون لوله را با معیاری به نام G نشان دهیم. کدام منحنی نمودار G در قسمت‌های مختلف کلیه را بهتر نشان می‌دهد؟

- | | | |
|-------|-------|---------|
| C (ج) | B (ب) | A (الف) |
| E (ه) | D (د) | |

۲۰. (۲ نمره) کدام نمودار نرخ بازجذب فعال NaCl را در طول لوله نفرون بهتر نشان می‌دهد؟

- | | | |
|-------|-------|---------|
| C (ج) | B (ب) | A (الف) |
| E (ه) | D (د) | |

۲۱. (۲ نمره) نمودار زیر، فشار خون یک سرخرگ در طول چرخه قلبی فردی را نشان می‌دهد. در این نمودار حداقل و حداکثر فشار رسم شده ۸۰ و ۱۲۰ میلی‌متر جیوه است. میانگین فشار خون این سرخرگ در این فرد چند میلی‌متر جیوه است؟ (نژدیکترین پاسخ را انتخاب کنید.)



- الف) ۷۸
ب) ۸۳
ج) ۹۳
د) ۱۰۲
ه) ۱۱۲

۲۲. (۳ نمره) می‌دانیم که TSH هورمون تحریک‌کننده غده تیروئید و T_4 مولتی‌هورمون تیروکسین است. پژوهشگری ارتباط هورمون‌ها با غده تیروئید افراد را بررسی می‌کند. آزمایش او روی ۲ گروه افراد سالم انجام می‌شود. افراد گروه ۱ تحت تأثیر ماده X و افراد گروه ۲ تحت تأثیر ماده Y قرار گرفتند. بعد از ۳ هفته، افراد گروه ۲ غده تیروئید بزرگ‌تر و metabolic rate کمتری نسبت به افراد گروه ۱ داشتند. کدام گزاره‌ها در مورد این آزمایش درست است؟

- I. ماده X TSH بوده است.
II. ماده Y T_4 بوده است.
III. ماده X خنثی (بی تأثیر) بوده است.
IV. ماده Y T_4 بوده است.
V. ماده X خنثی بوده است.

- VI. ماده Y خنثی بوده است.
VII. ماده X و Y خنثی بوده است.

باشگاه طلایی‌ها


۲۳. (۲ نمره) نمودار زیر میزان نمو و تمایزیاتگی دستگاه‌ها و سیستم‌های مختلف بدن یک انسان را در طول دوره رشد نسبت به یک فرد ساله نشان می‌دهد. هر کدام از موارد A، B و C به ترتیب مربوط به کدام دستگاه است؟
درصد نمو و تمایزیاتگی نسبت به یک فرد ۲۰ ساله




۲۴. (۲ نمره) همان طور که می‌دانیم، گلیول‌های سفید انسان از انواع سلول‌ها تشکیل شده‌اند. نوتروفیل‌ها، لنفوцит‌ها، مونوسیت‌ها و اتوژنوفیل‌ها برخی از این سلول‌ها هستند. در یک فرد سالم اتوژنوفیل‌ها درصد بسیار ناچیزی را تشکیل می‌دهند. به نظر شما افزایش قابل توجه اتوژنوفیل‌ها در خون با کدام گزینه در ارتباط است؟

- (الف) ویروس HIV و کوکسی‌های گرم‌منیت
(ب) آرژی و کرم آسکاریس
(ج) کوکسی‌های گرم‌منیت و آرژی
(د) ویروس HIV و سلول‌های سرطانی
(ه) ویروس HIV و کرم آسکاریس

۲۵. (۳ نمره) مراحل اولیه رشد و نمو جنینی در جانوران مختلف متفاوت است. اما به طور کلی از الگوهای تکوینی مشابهی تعیین می‌کنند. شکل‌های زیر، مقاطعی از مراحل اولیه رشد و نمو جنینی (گاسترولاجسون) را در یک دوزیست (شکل ۱) و در جانوری که معتقدند یکی از اشکال اولیه طنابداران است (شکل ۲) نشان می‌دهد. در هر دو شکل دیده می‌شود که سلول‌های اولیه تشکیل دهنده بدن جنین، شروع به حرکت کرده (فلشن‌ها)، بدین ترتیب که دسته‌ای از سلول‌های سطحی روی جنین اولیه (پلاستولا) خزیده و دسته‌ای دیگر به درون جنین فرو می‌رود و بدین صورت لایه‌های زاننده جنینی (اکتوورم، مژودرم و اندودرم) تشکیل می‌شود. با توجه به این که هر یک از این دسته سلول‌ها سرنوشت تکوینی متفاوتی دارند و سرنوشت سلول‌های بدن دوزیست در شکل ۱ نشان داده شده‌است. سرنوشت سلول‌ها در بدن جانور شکل ۲ را چگونه ارزیابی می‌کنید؟



۲۶. (۴ نمره) در نمودار زیر اسپیرومتری یک فرد سالم را مشاهده می‌کنید. به نظر شما کدام نمودار زیر به اسپیرومتری یک ورزشکار شباهت بیشتری دارد؟ (در تمام نمودارها فرد مورد آزمایش در حالت استراحت قرار دارد.)



۲۷. (۲ points) Homeostasis is best defined as:

- (الف) The ability to change rigid internal environment, in accordance to fluctuation in the external environment.
- (ب) The ability to cope with the change in external environment, in order to avoid changes in the internal environment.
- (ج) The ability to improve the external environment to improve the internal environment.
- (د) The ability to maintain a reasonably steady internal environment, despite fluctuation in the external environment.
- (ه) The ability to monitor changes in the external environment and compare it with the internal environment.

۲۸. (۲ نمره) در قرن هجدهم، دانشمندی به نام لینه، سیستم مدونی برای نام‌گذاری انواع گیاهان ابداع کرد. این سیستم - که روش نام‌گذاری دو اسمی خوانده می‌شد - بعدها در باره همه موجودات زنده تعمیم پیدا کرد. جدول زیر جایگاه حشره‌ای به نام horse fly را در این سیستم نشان می‌دهد. کدام یک از گزینه‌های زیر را به عنوان راسته (Order) این حشره انتخاب می‌کنید؟

Domain	Kingdom	Phylum	Class	Order	Family	Genus	Species
Eukarya	-	-	-	-	-	Tabanus	Tabanus opacus

(ج) بندهایان (Arthropoda)

(ب) دوبالان (Diptera)

(الف) شش‌بالان (Hexapoda)

(ه) خرمگسان (Tabanidae)

(د) جانوران (Animalia)

۲۹. (۳ نمره) نحوه حرکت کرم‌ها به وضعیت ساختاری بدن آن‌ها مانند نوع عضلات، حفره عمومی بدن و پوشش بدن بستگی دارد. سه نوع حرکت در کرم‌ها مشاهده می‌شود که عبارت‌اند از:

۱- خریدن و در موادی شناور موجی در آب

۲- باریک‌شدن و تشکیل ناحیه متورم در جلوی بدن (لنگر) و کشیدن مابقی بدن به سمت آن

۳- حرکت شلاقی یا سینوسی

با توجه به گزاره‌های زیر کدام گزینه، عضلات مؤثر در هر یک از حرکت‌های ۱، ۲ و ۳ را به ترتیب از راست به چپ مشخص می‌کند؟

I. عضله طولی II. عضله حلقوی III. عضله مورب IV. عضله طولی و حلقوی V. عضله طولی، حلقوی و مورب

ج) V، IV و I

ب) I، IV و III

IV و V، I

ه) III، II و V

I و IV، II

۳۰. (۲ نمره) کدامیک از شاخص‌های زیر در آب یک منطقه شهری، بیشتر نشان‌گر آلودگی انسانی شهری است؟

الف) رنگ زرد آب ب) نیترات آب ج) E.coli د) اکسیژن آب

۳۱. (۲ نمره) در رده‌بندی تیازایشی با توجه به شواهد، بعضی صفات را جدید و بعضی را قدیمی در نظر می‌گیرند. صفات زیر در ارتباط با دستگاه تولیدمثلی نهان‌دانگان است. با توجه به گزاره‌ها درست‌ترین گزینه را انتخاب کنید.

I. پرچم فراوان، صفتی جدید است. II. تخم‌دان زیزین، صفتی قدیمی است.

III. گل‌آذین، صفتی جدید است.

ه) III و II

د) I و III

III

ج) I

II

I

۳۲. (۲ نمره) با مشاهده برش‌های طولی از ساقه یک گیاه مشخص شد که بافت آوندی چوبی آن از نوع تراکنید قرصی است. با توجه به این مشاهده کدام گزاره‌ها درباره بافت آوند آبکش در این گیاه درست است؟

I. سلول همراه ندارد.

II. صفحه‌های غربالی دارد.

III. عنصر لوله غربالی ندارد.

ه) III و I

III و II

III

II

I


۳۳. (۲ نمره) در رنگ‌آمیزی مضاعف برش‌های گیاهی، بخش‌های چوبی به رنگ آبی و بخش‌های سلولزی به رنگ قرمز در می‌آیند. شکل مقابل بخشی از برش عرضی ساقه گیاهی را نشان می‌دهد. کدام گزاره‌ها درباره سلول‌های این بخش درست است؟

I. دیواره پسین ندارند.

II. مانع از رشد طولی گیاه می‌شوند.

III. سلول‌ها در حالت بلوغ مرده‌اند.

IV. با رنگ‌آمیزی مضاعف قرمز دیده می‌شوند.



ه) IV و I

III و II

III

II

I

۳۴. (۳ نمره) در کدام بافت مقدار کلیسیم نسبت به سایرین کم‌تر است؟


الف) بافت آوندی

ب) پارانشیم

ج) کلانشیم

د) مریستم

۳۵. (۳ نمره) کدام گزینه تغییرات غلظت یک عنصر در گیاه را زمانی که جذب سریع‌تر از رشد صورت می‌گیرد، بهتر بیان می‌کند؟



۳۶. (۲ نمره) اگر ریشه‌های نوبید قلمه قرار گرفته شده در محلول IAA (اکسین) قطع شوند، تشکیل ریشه‌های مجدد چگونه است؟

- (الف) ریشه جدید تشکیل نمی‌شود.
- (ب) ریشه‌های جدید به مقدار کم تشکیل می‌شوند، اما کوتاه هستند.
- (ج) ریشه‌های جدید به مقدار زیاد تشکیل می‌شوند، اما قطر کمتری دارند.
- (د) ریشه‌های جدید به مقدار زیاد تشکیل می‌شوند، اما کوتاه هستند.

۳۷. (۲ نمره) در مسیر افقی انتقال آب در ریشه، سد راه مسیر آبپلاسم چیست و آب از این سد چگونه عبور می‌کند؟

- (الف) حلقه کاسپاری، سمپلاسم
- (ب) آندودرم، واکوئل‌ها
- (ج) حلقه کاسپاری، آبپلاسم
- (د) حلقه کاسپاری، واکوئل‌ها

۳۸. (۲ نمره) تورئسانس و فشار اسمزی سلول‌های پاراتیشیم ریشه نسبت به آوندهای چوبی چگونه است؟

- (الف) بالاتر، بالاتر
- (ب) بالاتر، پایین‌تر
- (ج) پایین‌تر، بالاتر
- (د) پایین‌تر، پایین‌تر

۳۹. (۲ نمره) قطر درختان در طول شبانه‌روز در کدام زمان حداکثر است و کدام گزینه در مورد علت آن درست است؟

- (الف) صبح، زیرا تعرق حداکثر است.
- (ب) شب، زیرا تعرق حداقل است.
- (ج) پیش از ظهر، زیرا فشار ریشه‌ای در شب و صبح حداکثر بوده است.
- (د) ظهر، زیرا فشار ریشه‌ای حداکثر است.

۴۰. (۲ نمره) در بررسی پرندگان یک ناحیه که الگوی تک‌همسری دارند، دریافتیم که در سال جاری A دسته از آن‌ها ۱ تا ۳ و B دسته از آن‌ها ۴

یا بیشتر تخم گذاشته‌اند. در این مورد کدام گزاره‌(ها) همواره درست هستند؟

I. میانگین تعداد تخم گذاشته شده در سال جاری برابر با ۳ است.

II. میانگین تعداد تخم گذاشته شده در سال جاری به اعداد A و B بستگی دارد.

III. میانگین تعداد تخم گذاشته شده در سال جاری با داشتن A و B هم قابل محاسبه نیست.

IV. میانگین تعداد تخم گذاشته شده در سال جاری به شرط برابر بودن A و B برابر با ۳ است.

V. میانگین تعداد تخم گذاشته شده در سال جاری به شرط برابر بودن A و B از ۳ بزرگتر است.

(الف) I و II

(ج) IV و V

(ب) I و III

(د) IV

۴۱. (۲ points) Which statement is incorrect about habituation?

(الف) It shows influence of environment on the behavior.

(ب) It is an example of learning.

(ج) It is a loss of responsiveness on stimuli that convey useful information.

(د) It may increase fitness by allowing an animal's nervous system to focus on stimuli that signal presence of more important things.

(هـ) A *Hydra* doesn't response to useless stimuli; this is an example of habituation.

۴۲. (۲ points) Which statements are inappropriate descriptions for individuals of a species with clumped dispersion?

I. Strong food competition between individuals

II. Increasing efficiency of hunting

III. Non-uniform pattern of food distribution in the environment

IV. Absence of strong interactions between individuals

(الف) I, II

(ب) II , IV

(ج) II, III

(د) I, IV

(هـ) I, III, IV

مسائل

برای پاسخ دادن به پرسش‌های زیر عددی را که از شما خواسته شده، به دست آورید و رقم‌های پاسخ را در خانه‌های مربع‌شکل مربوط به هر پرسش در پاسخنامه بنویسید. مثلاً اگر عدد $109/3$ را به دست می‌آورید، آن را به صورت زیر در پاسخنامه وارد کنید:

رقم اعشاری	رقم صحیح
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/> ۱	<input type="text"/>
<input type="text"/> ۰	<input type="text"/>
<input type="text"/> ۹	<input type="text"/>
<input type="text"/> /	<input type="text"/> ۳
<input type="text"/>	<input type="text"/>

دقت کنید در صورتی که پاسخ نهایی شما بیش از ۲ رقم اعشاری داشته باشد، عدد را به صورت گرد شده تا ۲ رقم اعشار بنویسید.
توضیحات بیشتر در رابطه با نحوه پر کردن خانه‌ها در بالای پاسخنامه شما نوشته شده است. پاسخ درست به هر مسئله ۴ نمره در بر دارد.


مسئله	ماده	غلظت در محلول M
۱ و ۲	A	$0.2 M$
	B	$0.35 M$
	C	0.08 gr.dl^{-1}

* مسائل ۱ و ۲: دانشپژوهی برای انجام آزمایشی به تهیه محلول M نیاز داشت. این محلول از ۳ ماده A، B و C با غلظت‌های مشخص شده در جدول مقابل تشکیل می‌شود. ماده‌های A و C به صورت محلول‌های ۱ مولار آن‌ها و ماده B به صورت پودر خالص آن در آزمایشگاه او وجود داشت. می‌دانیم حلال همه این مواد آب است (جرم مولی مواد A، B، C به ترتیب 80 ، 120 و 95 گرم بر مول است).

اگر بدانیم، او برای تهیه محلول نهایی خود 12×10^{-5} نانولیتر محلول A را کاملاً مصرف کرده است، پاسخ دو مسئله زیر را به دست آورید.

۱. این دانشپژوه برای تهیه این محلول از چند میلی‌گرم پودر B استفاده کرده است؟


۲. این دانشپژوه برای تهیه محلول نهایی از چند میکرولیتر محلول C استفاده کرده است؟



۳. شجره‌نامه مقابله‌راثت یک بیماری را در خانواده‌ای نشان می‌دهد. قدر احتمال دارد که این بیماری وابسته به کروموزوم X باشد؟ (در مورد فراوانی بیماری‌های وابسته به X در جمعیت هیچ اطلاعاتی در دست نیست.)

۴. با توجه به هرم جمعیتی، 40% جمعیت کشوری را زنان تشکیل می‌دهند. در سال گذشته نرخ تولد و نرخ مرگ و میر به ترتیب 60 و 25 نفر از هر 1000 نفر جمعیت بوده است. همچنین نرخ مهاجرت به خارج حدود 50 نفر به ازای هر 10000 مرد بوده است. نرخ مهاجرت به این کشور از سایر نقاط جهان ناقیز گزارش شده است. رقم دقیق نرخ رشد جمعیت (Growth rate) در سال گذشته چند درصد بوده است؟

۵. فرض کنید لیپوزوم مدلی داریم که حجم اولیه آن 1 nl است. آن را درون محیطی آبی (با حجم بسیار زیاد) قرار می‌دهیم که حاوی سوکروز 0.5 M و اوره 0.25 M است. اگر مولکول‌های بدن باز D (با غلظت 0.25 مولار) تنها ماده حل شده در محیط آبی درون لیپوزوم باشد، حجم نهایی این لیپوزوم چند بیکولیتر است (دقت کنید که غشای لیپوزوم نسبت به اوره و آب نفوذپذیر و نسبت به سوکروز و مولکول D نفوذناپذیر است).



عَ تصویری که در سمت چپ مشاهده می‌کنید، نمای بخشی از تصویر سمت راست است که زیر میکروسکوبی با عدسی شیشی $40\times$ مشاهده شده است. اگر کل قسمت تبره شده مساحتی برابر با $2/75$ میلی‌متر مربع داشته باشد، مساحت میدان دید میکروسکوب در بزرگنمایی مورد استفاده چند برابر مساحت یک مربع با ضلع 100 میکرومتر است؟
